

hemos visto algunos afectos reumáticos y catarrales, bronquitis con congestión pulmonar, pero han disminuido las erupciones de los meses anteriores.

En los niños la coqueluche es aumentado, anginas de carácter exudativo, todo debido a la presencia de las emanaciones que no han guardado relación con el calor del día.

La mayoría de las enfermedades han sido tan benignas como en el pasado mes. No habiendo otro suceso que traer termino a sesión.

El Sr.

Salvador Dominguez

El Director

José Bonday

Sesión del 18 de Octubre del año 1866.

Con asistencia del Sr. Director y Sr. se leyó y aprobó el acta anterior.

Respecto a la formación del cólera ha podido conseguirse con satisfacción que no tiene noticia de la existencia de otro foco en ningún punto, si bien continúan las mismas precauciones respecto a las procedencias de Francia y Gibraltar.

Los afectos predominantes hasta el 8 de este mes en que por espacio de cinco días he mos tenido tan fuertes aguaceros, han sido los mismos que en el mes anterior, pero efecto de las alteraciones atmosféricas las afeciones reumáticas y catarrales han tomado mayor intensidad y las intermitentes aunque en menor número han presentado alguna gravedad afiriendo el carácter estivo.

En los niños no han aumentado los afectos otros en el pasado mes, presentándose en cambio catarras inflamatorios de carácter franco.

Por fin se consiguió la benignidad de los afectos otros y se levantó la sesión.

El Sr.

Salvador Dominguez

El Director

José Bonday

Sesión del 22 de Noviembre de 1866.

Con asistencia del Sr. Director y Sr. fue leído y aprobado el acta de la anterior.

Continuando la formación sus indagaciones sobre el cólera en todo el mundo, ha podido con satisfacción conseguirse en un acta de esta sesión, que según documentos oficiales que han visto la luz pública en los periódicos españoles, tanto de París como del puerto de Marsella ha desaparecido por completo dicha enfermedad, existiendo ya de otro punto patente limpia desde principios de este mes; no constando por otra parte su existencia en otro punto.

Las enfermedades reumáticas estivas pueden reducirse a los catarras y reu-